

# Διμερή Γραφήματα και Ταιριάσματα

---

Διδάσκοντες: **Δ. Φωτάκης, Δ. Σούλιου**  
Επιμέλεια διαφανειών: **Δ. Φωτάκης**



Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



# Διμερές Γράφημα

- **Ανεξάρτητο σύνολο:** σύνολο κορυφών που δεν συνδέονται με ακμή.
- Διμερές γράφημα: υπάρχει διαμέριση κορυφών σε **δύο ανεξάρτητα σύνολα**.
  - $G(X, Y, E)$ :  $X$  και  $Y$  ανεξάρτητα σύνολα, ακμές μόνο μεταξύ κορυφών  $X$  και  $Y$ .
  - $G$  διμερές αν **δεν έχει κύκλους περιττού μήκους**.
  - Κύκλος  $n$  κορυφών  $C_n$ : διμερές αν  **$n$  άρτιος**.
  - Μέγιστος #ακμών σε απλό διμερές γράφημα με  $n$  κορυφές;
- Πλήρες διμερές γράφημα  $K_{n,m}$ :
  - Δύο ανεξάρτητα σύνολα με  $n$  και  $m$  κορυφές.
  - Όλες οι  **$n \cdot m$  ακμές** μεταξύ τους.
  - Π.χ.  $K_{3,3}$  έχει 9 ακμές.



# Χαρακτηρισμός Διμερών Γραφημάτων

- Γράφημα  $G(V, E)$  είναι διμερές αν το  $G$  **δεν έχει κύκλους περιττού μήκους**.
  - Αν  $G$  διμερές με ανεξάρτητα σύνολα  $X$  και  $Y$ , κάθε κύκλος  $C$  έχει τόσες κορυφές του  $X$  όσες και του  $Y$ : άρα  $C$  άρτιου μήκους.
  - Αντίστροφο: έστω ότι  $G$  **δεν έχει κύκλους περιττού μήκους**.
  - Αυθαίρετη κορυφή  $s$  και αποστάσεις  $d(s, u)$  προς κάθε κορυφή  $u$ .
  - $X = \{ u : d(s, u) \text{ άρτιος} \}$  και  $Y = \{ u : d(s, u) \text{ περιττός} \}$
  - Έστω ότι δύο κορυφές  $x, y$  στο  $X$  συνδέονται με ακμή.
  - Έστω  $w$  πρώτη κοινή κορυφή συντομότερων  $x - s$  και  $y - s$  μονοπατιών (υπάρχει πάντα, αφού μονοπάτια καταλήγουν στην  $s$ ).
  - Αμφότερα συντομότερα μονοπάτια: τμήματα  $w - s$  μήκους  $d(s, w)$ .
  - Άρα  $d(w, x) + d(w, y)$  είναι άρτιος και  $(w, \dots, x, y, \dots, w)$  είναι κύκλος περιττού μήκους – άτοπο!
- Κατασκευαστική απόδειξη με «πιστοποιητικό ορθότητας»!



# Διμερή Υπογραφήματα

---

- Κάθε γράφημα  $G(V, E)$  με  $m$  ακμές περιέχει διμερές υπογράφημα  $G'(X, Y, E')$  με τουλάχιστον  $m/2$  ακμές.
  - Βλ. και πρόβλημα **MAX CUT**. Ισχύει και για πολυγραφήματα χωρίς ανακυκλώσεις.
- Απόδειξη με πιθανοτική μέθοδο:
  - Κάθε κορυφή στο  $X$  με πιθανότητα  $1/2$ , διαφορετικά στο  $Y$ .
  - $\forall$  ακμή  $\{u, v\}$ ,  $\text{Prob}[\{u, v\} \text{ μεταξύ } X \text{ και } Y] = 1/2$ .
  - Γραμμικότητα μέσης τιμής:  $\text{Exp}[\# \text{ακμών μεταξύ } X \text{ και } Y] = m/2$
  - Άρα υπάρχει διαμέριση  $(X, Y)$  ώστε  $\# \text{ακμών μεταξύ } X \text{ και } Y \geq m/2$
- Κατασκευαστική απόδειξη:
  - Εξετάζουμε κορυφές μία-μία με τη σειρά. Κορυφή  $u$  στο  $X$  αν έχει πιο πολλούς γείτονες στο  $Y$  από ότι στο  $X$ , διαφορετικά στο  $Y$ .
  - «Κρατάμε» μεταξύ  $X$  και  $Y$  τουλάχιστον τόσες ακμές όσες «διώχνουμε». Τυπική απόδειξη με επαγωγή στον  $\#$ κορυφών.




# Ταιριάσματα (Matchings)

- **Ταίριασμα** σε γράφημα  $G(V, E)$ : σύνολο ακμών  $M \subseteq E$  χωρίς κοινά άκρα.
  - Κορυφή βαθμού 1 στο  $M$ : **ταιριασμένη**. Διαφορετικά **ελεύθερη**.
  - $M$  **τέλειο ταίριασμα** αν **όλες** οι κορυφές του  $G$  **ταιριασμένες**.
  - $M$  **μέγιστο ταίριασμα** αν για κάθε ταίριασμα  $M'$ ,  $|M| \geq |M'|$ .
  - $M$  **μεγιστοτικό (maximal)** αν καμία ακμή στο  $E$  δεν έχει δύο ελεύθερα άκρα.
  - $M$  **μεγιστοτικό** αν **ελεύθερες κορυφές** αποτελούν **ανεξάρτητο σύνολο**.






# Εναλλακτικά και Επαυξητικά Μονοπάτια

- Έστω ταίριασμα  $M$  σε γράφημα  $G(V, E)$ .
  - Μονοπάτι  $p$  στο  $G$  είναι εναλλακτικό (alternating) για  $M$  αν οι ακμές του εναλλάσσονται εντός και εκτός  $M$ .
    - Συμμετρική διαφορά  $M \oplus p$  αποτελεί (ή οδηγεί εύκολα σε) ταίριασμα.
  - Μονοπάτι  $p$  στο  $G$  είναι επαυξητικό (augmenting) για  $M$  αν είναι εναλλακτικό και τα άκρα του είναι ελεύθερες κορυφές.
    - $M \oplus p$  αποτελεί ταίριασμα με  $|M \oplus p| = |M| + 1$ .
    - Ταίριασμα  $M$  με επαυξητικό μονοπάτι δεν είναι μέγιστο.



# Μέγιστα Ταιριάσματα – Θεώρημα Berge

- Ταίριασμα  $M$  μέγιστο ανν δεν έχει επαυξητικό μονοπάτι.
  - Έστω  $M$  όχι μέγιστο και  $M'$  μέγιστο ταίριασμα,  $|M'| > |M|$ .
  - $G'(V, M \oplus M')$  έχει ως συνεκτικές συνιστώσες κύκλους άρτιου μήκους (με εναλλάξ ακμές) και εναλλακτικά μονοπάτια για  $M$ .
  - Αφού  $|M'| > |M|$ , υπάρχει μονοπάτι / συνιστώσα  $p$  στο  $G'$  όπου ακμές του  $M'$  είναι περισσότερες από ακμές του  $M$ .
  - Το  $p$  αρχίζει και τελειώνει με ακμές του  $M'$ . Άρα άκρα του  $p$  είναι ελεύθερα στο  $M$ .
  - Μονοπάτι  $p$  είναι επαυξητικό για  $M$ .



# Τέλεια Ταιριάσματα σε Διμερή Γραφήματα – Θεώρημα Hall

---

- Διμερές γράφημα  $G(X, Y, E)$ , με  $|X| = |Y|$ , έχει **τέλειο ταίριασμα** ανν για κάθε  $S \subseteq X$ ,  $|N(S)| \geq |S|$  (1).
- Αν  $M$  τέλειο ταίριασμα,  $|N(S)| \geq |M(S)| = |S|$ , για κάθε  $S \subseteq X$ .
  - $M(S)$  σύνολο κορυφών ταιριασμένων στο  $M$  με κορυφές  $S$ .
- Έστω ότι ισχύει η (1) και  $M$  όχι τέλειο ταίριασμα. Θα βρούμε **επαυξητικό μονοπάτι  $p$**  για  $M$  με βοήθεια της (1).



# Τέλεια Ταιριάσματα σε Διμερή Γραφήματα – Θεώρημα Hall

- Διμερές γράφημα  $G(X, Y, E)$ , με  $|X| = |Y|$ , έχει **τέλειο ταίριασμα** ανν για κάθε  $S \subseteq X$ ,  $|N(S)| \geq |S|$  (1).
  - Έστω  $x$  μια ελεύθερη κορυφή στο  $X$  ( $S_0 = \{x\}$ ).
  - Αν  $N(x)$  έχει ελεύθερη κορυφή  $y$ ,  $(x, y)$  επαυξητικό μονοπάτι.
  - Διαφορετικά,  $S_1 = \{x\} \cup M(N(S_0))$ ,  $|S_1| \geq 1 + |S_0|$ .
  - Αν  $N(S_k)$ ,  $k \geq 1$ , έχει ελεύθερη κορυφή, σταματάμε.
  - Διαφορετικά,  $S_{k+1} = \{x\} \cup M(N(S_k))$  και συνεχίζουμε.
  - Φτιάχνουμε δέντρο εναλλακτικών μονοπατιών με ρίζα τη  $x$ .
    - Αν έχει ελεύθερη κορυφή ως φύλλο, **επαυξητικό μονοπάτι!**
  - Όσο συνεχίζουμε,  $|S_{k+1}| \geq 1 + |N(S_k)| \geq 1 + |S_k|$ , λόγω (1).
    - Διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί με επαυξητικό μονοπάτι!
  - Κατασκευαστική απόδειξη: **τέλειο ταίριασμα** ή  $S \subseteq X$  με  $N(S) < |S|$ .

# Τέλεια Ταιριάσματα σε Διμερή Γραφήματα

- Αν  $G(X, Y, E)$   $k$ -κανονικό διμερές γράφημα, τότε  $|X| = |Y|$ .
  - $|E| = k|X|$  και  $|E| = k|Y|$ , άρα  $|X| = |Y|$ .
- Έστω  $G(X, Y, E)$   $k$ -κανονικό διμερές γράφημα με  $k \geq 1$ . Τότε  $G$  έχει τέλειο ταίριασμα.
  - Έχουμε  $|X| = |Y|$ .
  - Θεωρούμε κάποιο  $S \subseteq X$  και τη γειτονιά του  $T = N(S) \subseteq Y$ .
  - Ακμές που προσπίπτουν στο  $T$  τουλάχιστον όσες οι ακμές που προσπίπτουν στο  $S$ , ή  $|E(T)| \geq |E(S)|$ .
  - Άρα  $|E(T)| = k|T| \geq |E(S)| = k|S|$ , οπότε  $|T| \geq |S|$ .
  - Δηλαδή, για κάθε  $S \subseteq X$ ,  $|N(S)| \geq |S|$ .
  - Άρα  $G$  έχει τέλειο ταίριασμα λόγω  $\Theta$ . Hall.